

PROCEDURE DEROULEMENT DE LA MOBILISATION DES CSHP

ETIQUETTE
PATIENT

Date de la greffe : ___/___/___

Pose de PAC le ___/___/___

HDJ KT

Hospitalisation

Hospitalisation du patient dans le service le ___/___/___

Bilan pré-cytaphérèse (≤ 28 jours avant la 1^{ère} cytaphérèse)

Radio-pulmonaire et ECBU

Prendre RDV pour vérification du capital veineux par IDE cytaphérèse (poste 24550, 29543), prévue le ___/___/___

Vérifier RDV pose KT fémorale prévu **pour J11 en première position** (poste coordination : 29454, poste bloc si urgence 26701)

Hyperhydratation 1L de sérum physiologique + 1L B26 le ___/___/___

J1 : ___/___/___

Endoxan 1g/m² soitmg (J1)

Envoie du bilan pré-cytaphérèse au service de cytaphérèse

Demande de RDV pour la cytaphérèse

J2 : ___/___/___

Endoxan 1g/m² soitmg (J2)

J3 : ___/___/___

Surveillance clinique

J4 : ___/___/___

Surveillance clinique

J5 : ___/___/___

Début G-CSF 10 μ g/kg/j en 2inj/jour

Soit 5 μ g/kg matin et 5 μ g/kg à 12h d'intervalle

Mettre la feuille de surveillance dans la chambre du patient

Patient mis en **CHAMBRE SEUL**

J6 : ___/___/___

G-CSF 10 μ g/kg/j en 2inj/jour

Soit 5 μ g/kg matin et 5 μ g/kg à 12h d'intervalle

NFS + isolement + surveillance clinique 2fois/j + le poids 1fois/j

J7 : ___/___/___

G-CSF 10 μ g/kg/j en 2inj/jour

Soit 5 μ g/kg matin et 5 μ g/kg à 12h d'intervalle

NFS + Isolement + surveillance clinique 2fois/j + le poids 1fois/j

J8 : ___/___/___

G-CSF 10 μ g/kg/j en 2inj/jour

Soit 5 μ g/kg matin et 5 μ g/kg à 12h d'intervalle

NFS + isolement + surveillance clinique 2fois/j + le poids 1fois/j

- J9 : ___/___/___ G-CSF 10µg/kg/j en 2inj/jour
Soit 5µg/kg matin et 5µg/kg à 12h d'intervalle
NFS + Isolement + surveillance clinique 2fois/j + le poids 1fois/j
- J10 : ___/___/___ G-CSF 10µg/kg/j en 2inj/jour
Soit 5µg/kg matin et 5µg/kg à 12h d'intervalle
NFS + Isolement + surveillance clinique 2fois/j + le poids 1fois/j
- J11 : ___/___/___ G-CSF 10µg/kg/j en 2inj/jour
Soit 5µg/kg matin et 5µg/kg à 12h d'intervalle
ATTENTION !!! Prélèvement NFS + + test CD34 à faire à 7h30 avant le G-CSF, tube pour CD34 à descendre en main propre à la cytaphérèse à 8h
Bilan de coagulation + ECG
Pose du KT fémoral ce jour **en première position** (poste coordination : 29454, poste bloc si urgence 26701) si mauvais capital veineux et si sortie d'aplasie à J10
- **Si test CD34 positif** : 1^{ère} cytaphérèse ce jour
 - **Si test CD34 négatif** : refaire le test CD34 le lendemain (répéter étape J11 jusqu'à test CD34 positif)
- 1^{ère} cytaphérèse**
- **Si quantité de CD34 suffisant** : fin de la mobilisation et arrêt du G-CSF
 - **Si quantité de CD34 insuffisant** : continuer le G-CSF
- J12 : ___/___/___ G-CSF 10µg/kg/j en 2inj/jour
Soit 5µg/kg matin et 5µg/kg à 12h d'intervalle
Faire G-CSF à 7h puis descendre à 8h30 à la cytaphérèse
- 2^{ème} cytaphérèse**
- **Si quantité de CD34 suffisant** : fin de la mobilisation et arrêt du G-CSF
 - **Si quantité de CD34 insuffisant** : continuer le G-CSF
- J13 : ___/___/___ G-CSF 10µg/kg/j en 2inj/jour
Soit 5µg/kg matin et 5µg/kg à 12h d'intervalle
Faire G-CSF à 7h puis descendre à 8h30 à la cytaphérèse
- 3^{ème} cytaphérèse**
- **Si quantité de CD34 suffisant** : fin de la mobilisation et arrêt du G-CSF
 - **Si quantité de CD34 insuffisant** : fin de la mobilisation et arrêt du G-CSF