

**PROTOCOLE DE CONDITIONNEMENT CLASSIQUE :
CYCLOPHOSPHAMIDE 200 mg/kg + SERUM ANTI-LYMPHOCYTAIRE DE LAPIN 6 mg/kg**

	POSOLOGIE	VOIE ADM	SOLVANT - DUREE	J-5	J-4	J-3	J-2	J-1	J0 GREFFE
Hydratation : Poly-ionique (G5 % + NaCl 4g/L + KCl 2g/L) + NaCl 0,9%	2 litres poly-ionique + 1 litre NaCl 0,9% /j	IV		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Surveillance quotidienne du poids et du bilan entrées-sorties 3 fois par jour									
ONDANSÉTRON (Zophren®)¹	8 mg 30 min avant la chimiothérapie puis 16mg/24h	IV IVSE	Dans 50 ml de G5 % en 15 min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEXCHLORPHÉNAMINE (Polaramine®) (avant SAL, avant CSH)	5mg à H-1 et à H4 du SAL, 5 mg avant CSH	IVD	En 2-3 min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
METHYLPREDNISOLONE (Solumédrol®)	1mg/kg à H-1 et 1mg/kg à H4 du SAL	IV ou PO	Dans 50 ml de G5 % ou NaCl 0,9 % en 30 min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PARACÉTAMOL² (avant SAL, avant CSH)	1g à H-1 et 1g à H4 du SAL, 1g avant CSH	IV	Dans 50 ml de G5 % ou NaCl 0,9 % en 30 min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SERUM ANTI-LYMPHOCYTAIRE DE LAPIN (Thymoglobuline®)	6 mg/kg dose totale	IV	Dans 500 ml de G5 % avec augmentation progressive du débit ³	0,5 mg/kg <input type="checkbox"/>	1,0 mg/kg <input type="checkbox"/>	1,5 mg/kg <input type="checkbox"/>	1,5 mg/kg <input type="checkbox"/>	1,5 mg/kg <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CYCLOPHOSPHAMIDE (Endoxan®)	50 mg/kg/j	IV	Dans du G5 % ou NaCl 0,9 % (volume total le plus faible possible) en 2h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
MESNA (Uromitexan®)	25 mg/kg au minimum x 3/j	IV	H0 avec cyclophosphamide H4 et H8 dans 100 ml de NaCl 0,9 % (ou G5%) en 30 min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
HÉMISUCCINATE D'HYDROCORTISONE	50 mg avant CSH	IV							<input type="checkbox"/>

¹ Eviter l'aprepitant (Emend) du fait du risque d'interaction avec potentielle diminution d'efficacité du cyclophosphamide

² Paracétamol : ne pas dépasser 4g/jour en comptant tous les apports

³ Administration du SAL : commencer à 10 ml/h, en l'absence de réaction augmenter par palier de 10 ml/h toutes les 30 min (débit maximal de 50ml/h)