

## PROTOCOLE CYCLOPHOSPHAMIDE MOBILISATION

	POSOLOGIE	VOIE ADM	SOLVANT - DUREE	J1	J2	J3	J4	J5 et suivants
<b>Hydratation :</b> bionolyte G5 %	2 litres max par jour	IV		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Relais 250ml G5%
<i>Surveillance quotidienne du poids et de la diurèse</i>								
<b>ONDANSÉTRON (Zophren®)<sup>1</sup></b>	<b>8 mg 30 min avant la chimiothérapie, à renouveler si besoin</b>	IV	Dans 50 ml de G5 % en 15 min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> si besoin		
<b>CYCLOPHOSPHAMIDE (Endoxan®)</b>	<b>1 g/m<sup>2</sup>/jour</b>	IV	Dans du G5 % ou NaCl 0,9 % (volume total le plus faible possible) en 1h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>MESNA (Uromitexan®)</b>	<b>400 mg/m<sup>2</sup> au minimum x 3 /jour</b>	IV	H0 avec le cyclophosphamide H4 et H8 dans 100 ml de NaCl 0,9 % (ou G5%) en 30 min	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<b>FILGRASTIM ou LENOGRASTIM</b>	<b>5 µg/kg x 2 / jour à partir de J5 jusqu'au recueil de CSP, pendant au moins 7 jours</b>	SC de préférence (sinon IV)						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Attention, éviter l'aprepitant (Emend) du fait du risque d'interaction avec potentielle diminution d'efficacité du cyclophosphamide